



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA

Via Manzoni, 3 - 00010 MARCELLINA Tel. 0774 424464 - Fax 0774 429868 - Distretto 33

Codice Meccanografico RMIC8AS009 - Codice Fiscale 86000200583 - Codice univoco UF8Y3G

rmic8as009@pec.istruzione.it - rmic8as009@istruzione.it - www.icmarcellina.edu.it

CIRCOLARE N. 63

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI MARCELLINA
LORO SEDI

Oggetto: Comunicazione e misure di prevenzione e profilassi per pediculosi

Con la presente si invitano le famiglie e gli studenti ad azioni di verifica della cute al fine di prevenire la pediculosi. Di seguito sono riportate le misure di profilassi come da indicazioni ASL.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA Angela Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co2 D.Lgs 39/93

Misure di profilassi per esigenze di sanità pubblica PEDICULOSI - FTIRIASI ICD-9 132-132.9

Periodo di incubazione	Periodo di contagiosità	Provvedimenti nei confronti del malato	Provvedimenti nei confronti di conviventi e di contatti
In condizioni ottimali per il ciclo vitale dei pidocchi, da 6 a 10 giorni in caso di infestazione con uova.	Fintanto che uova, forme larvali o adulte sono presenti e vitali sulle persone infestate o su indumenti.	In caso di infestazione da P. humanus corporis isolamento da contatto per non meno di 24 ore dall'inizio di un adeguato trattamento disinfestante. Il trattamento disinfestante consiste nell'applicazione di polvere di talco contenente DDT al 10% oppure Malathion all'1% oppure permetrina allo 0,5% o altri insetticidi.	Sorveglianza sanitaria per l'identificazione di altri casi di parassitosi, e conseguente trattamento disinfestante.

		<p>Gli indumenti vanno trattati con gli stessi composti applicati sulle superfici interne oppure lavati con acqua bollente. Il trattamento disinfestante, consistente in applicazione di shampoo medicati contenenti permectrina all'1% o piretrine associate a piperonil-butossido, o benzilbenzoato o altri insetticidi, deve essere periodicamente ripetuto ogni 7-10 giorni per almeno un mese. Pettini e spazzole vanno immersi in acqua calda per 10 minuti e/o lavati con shampoo antiparassitario.</p>	
--	--	--	--

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF.SSA Angela Bianchi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 co2 D.Lgs 39/93